

EGYSEJT-FEHÉRJE (SCP) ELŐÁLLÍTÁSA

SCP = Single Cell Protein = egysejt-fehérje

A fermentáció célja maga a sejtömeg.

Az emberiség ellátására egyre nagyobb mennyiségű fehérjére van szükség, ezt a mezőgazdaság/állattenyésztés nem tudja biztosítani. →

Mennyiségi és minőségi fehérje-éhezés – esszenciális AS

A mikroba fehérje összetétele és tápértéke jó, de fajtánként változó →

Felhasználás: rendszerint állati takarmányként hússá stb. alakítják.


De: háborús időkben emberek is fogyasztottak élesztőt (SZU, Németo.), és ma is van néhány élelmiszertermék.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

1

A FEHÉRJE FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA



BME Alkalm

EGYSEJT-FEHÉRJE (SCP) ELŐÁLLÍTÁSA

%	élesztő	metanolbaktérium	tisztított fehérje	gombák	algák	szójaliszt	tejpor
fehérje	60.0	83.0	80.0	42.0	70.0	45.0	34.0
zsírsavak	9.0	7.4	8.0	13.0	5.0	1.8	1.0
nukleinsavak	5.0	15.0	1.0	9.7	4.0		
ásványi sók	6.0	8.6	8.0	6.6	7.0	6.0	8.0
aminosavak	54.0	65.0				40.0	
nedvességtartalom	4.5	2.8	4.0	13.0	6.0	12.0	5.0



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

3

EGYSEJT-FEHÉRJE

ELŐNYEI:

- fehérje tartalma nagy,
- zsírtartalma kicsi (ezen belül is kevés a telített zsírsav), kevés rost,
- kevés a só,
- jó a tápértéke,
- vitaminok
- kicsi generációs idő (vö. állatok)

HÁTRÁNYAI:

- Nagy a nukleinsav tartalom (→ húgysav → köszvény)
- Toxikus és vagy karcinogén anyagok (szénhidrogén szubsztrátból)
- Nehezen emészthető sejttal → lassú emésztés, allergia
- Az aminosav összetétel nem ideális (Met, Cys kevés)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

4

SZUBSZTRÁTOK

Az egysejt-fehérje árában a legnagyobb tétel a szubsztrát, ezért a gyártás gazdaságossága a (szója)fehérje és a szubsztrát pillanatnyi árától függ.

FŐ SZÉNFORRÁSOK:

- Szén-dioxid (légköri)
- Szénhidrátok
- Szénhidrogének
- Alkohokok



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

5

SZUBSZTRÁTOK

Szén-dioxid (légköri)
autotróf + fény kell hozzá, napenergia



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

6

SZUBSZTRÁTOK

B). Algatenyésztés valódi algák = zöldalgák

- b1) Beton vagy műanyag lagúnában, csatornában, 20-50 cm mély víz
 Napfényes helyeken: Izrael, Florida.
 Folytonos tenyésztés
 CO_2 + kevés O_2 betáplálás – ülepedés miatt,
 + N forrás,
 baktériumos befertőződés felléphet.
 Befektetés: 20.000 USD/ha,
 A termék fehérjetartalma 40-50%, nukleinsav tartalma kicsi, 4-6%.
 Sejtkinyerés: flokuláltatással $\text{Ca}(\text{OH})_2$ adagolással, mert a centrifugálás drága.
 Előállítási költség: 4-10 USD/kg (a szója csak 3 USD/kg)



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

7

SZUBSZTRÁTOK

- b2) HETEROTRÓF ALGASZAPORÍTÁS.
Chlorella sp. melaszon, folytonos, aszeptikus eljárás.
 Japán: termelés 3.000 t/év,
 előállítási költsége: 10-15 USD/kg,
 felhasználás: speciális élelmiszer adalék.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

8

TENYÉSZTÉS SZÉNHIDRÁTOKON

Ideális szubsztátok, megújuló, heterotrófok hasznosítják.
 De: a poliszacharidokat le kell bontani.

Szénhidrát források		$\times 10^6$ tonna/év
cukrok	melasz	9,3
	tejsavó	1,5 (USA)
	szulfít szennylúg	12
keményítő cellulóz	zöldség feldolgozás maradék	
	préseelt cukornád	106
	búzakorpa	58
	búzaszalma	864
	rizszalma	599
	kukorica maradék	193
	városi hulladékok (papír)	152
faipari és erdészeti maradék	61	



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

9

TENYÉSZTÉS SZÉNHI DRÁTOKON

a.) SCP termelés melaszon:

35-50% cukortartalom, ezt felhígítják 4-6%-ra, sterilizelik.

Törzsek: *C. utilis*, *S. cerevisiae*,

Erőteljes levegőztetés

folytonos szaporítás, $D = 0,2-0,3$

Nagy produktivitás, olcsó.

Centrifugálás,

Tajvan, Dél-Afrika, Oroszország: élelmiszer kiegészítő + takarmány, (háborús időszak)

Pékélesztő gyártás ~600.000 t/év




BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

10

PÉKÉLESZTŐ GYÁRTÁS

DIAGRAM OF YEAST PRODUCTION



TENYÉSZTÉS SZÉNHI DRÁTOKON

b.) SCP termelés laktózon:

A sajtgyári savó kb. 5 % tejcukrot és 1 % fehérjét tartalmaz.

Ha ez szennyvízként megy el, akkor BOI = 70.000 !!

Ezért inkább ultraszűréssel elválasztják a fehérjét (tápszer, élelmiszeripari adalék) és a laktózon

Saccharomyces lactis,

Candida utilis,

Saccharomyces fragilis,


Kluyveromyces lactis

törzseket szaporítanak. →



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

12



BEL FROMAGERIES-ELJÁRÁS

Kluyveromyces marxianus-szal, tejsavón:

Szubsztrát: tejsavó ~ 5% laktózt, 0,8% proteint, és 0,2-0,6% tejsavat tartalmaz

Ha biomasszát akarunk termelni, akkor levegőztetjük a fermentációt, míg az alkohol gyártásnál minimális a levegőztetés

A takarmányozási célú biomasszához az összes ásványi anyag és tejsav is felhasználható: → bepárlás, → porlasztva szárítás

Élelmiszer minőségű biomassza előállításához a sejteket centrifugálják, mossák és szárítják.

14

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

TENYÉSZTÉS SZÉNHIDRÁTOKON

c.) szulfitszennylúgon
Papír ill. cellulóz gyártás szennyvize, 2-7 % cukrot (elsősorban pentózokat) + szerves savakat tartalmaz, BOD~50.000

Candida utilis, törzssel (Csehország)
Folytonos eljárás, 3x800 m³-es fermentor,
Termelése: 25.000 t SCP/év

Pekilo eljárás
Paecilomyces varioti törzssel (Finnország) 10.000 t/év, a pentózt és ecetsavat jobban hasznosítja
Fehérjetartalom: 55-60 %
360 m³-es keverős fermentor, folytonos, D = 0.2

15

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

TENYÉSZTÉS SZÉNHIDRÁTOKON

d.) glükózon

általában nem gazdaságos, de az RHM Mycoprotein (élelmiszer) eljárása: *Fusarium graminearum* törzssel igen.

Folytonos kemosztát tenyésztés (D = 0,2) glükózon, air lift, + NH₃ gáz bevezetés (pH szabályozás és N forrás).

- Feldolgozás:
1. Ciklonos sűrítés
 2. Hőkezelés: 20 percig 64°C-on;
 - A hőstabil RNáz lebontja az RNS-t 10%-ról 2%-ra.
 - A proteázok inaktiválódnak, ezáltal stabilabb termék.
 3. Szűrés, 4. Szárítás,

45% fehérjetartalmú anyag, +tojásfehérjével, extrudálással, gőzöléssel, fagyasztással javítják a textúráját.

10 éves állati és humán kísérletek után, 1985-ben engedélyezték.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

16



A *F. graminearum*-mal glükózon előállított (RHM) gombaproteint Nagy-Britanniában Quorn márkanéven, ~50 élelmiszerben forgalmazzák „Healthy food”, húspótló, vegák.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

TENYÉSZTÉS SZÉNHIDRÁTOKON

e.) keményítő hulladékon

Symba eljárás (svéd)

Keményítő hulladékok a keményítő gyártásból, pl. burgonya szelet.

1. lépcső: *Endomycopsis fibuliger* (amiláz termelő) + NH₃
2. lépcső: *Candida utilis* élesztő sejtömeg

Folytonos eljárás,

A BOD lemegey ~ 1000 mg O₂/l -re

Solid substrate fermentation = szilárd fázisú fermentáció (mint a silózás)


szilárd hulladék + NH₄ + só + mikroba,

Fehérjetartalom 10-15%, sok rost és hamu ballaszt



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

18



TENYÉSZTÉS SZÉNHIDRÁTOKON

f.): cellulózon/hemicellulózon

A tiszta cellulóz enzimes bontása úgy-ahogy megy, de a hemicellulózzal és a ligninnel együtt nehéz. Kémiai/fizikai előkezelés kell → megdrágítja a folyamatot.

Minimum 3 enzim kell a komplex szerkezet lebontásához:


- Endo β1,4-glukanáz, endocelluláz, C_x enzim, oldható cellulózból C_x hatására lesz cellobióz és oligomerek
- Exo β1,4-glukanáz, cellobiohidroláz, c1 enzim, a *Trichoderma viridae* enzimei-nek 80%-a ez. Kristályos cellulózból c1 hatására lesz cellobióz
- β-1,4-glükózidáz, cellobiáz a cellobiózt 2 glükózra hasítja

Hatásukra → glükóz + ötszénatomos cukrok keletkeznek.

A *Trichoderma viridae* és *Penicillium*, *Aspergillus* fajok termelik, de nem nagyipari SCP eljárás.

SSF: *Trichoderma* + NH₄ + szalma → takarmány, ~15% fehérjetartalom

20



TENYÉSZTÉS SZÉNHYDROGÉNEKEN

Biokémiai folyamatok:

Terminális oxidáció: a lánc végén kezdődik (-OH, -CHO, -COOH) majd béta-oxidációval folytatódik

Szubterminális oxidáció: alfa helyzetben jelenik meg egy keto-csoport és egy CO₂ molekula hasad le.


→



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

22

TENYÉSZTÉS SZÉNHYDROGÉNEKEN



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

23

TENYÉSZTÉS SZÉNHYDROGÉNEKEN

n-alkánokon

C₁₀-C₁₇ gázolajfrakcióból molekulaszűréssel vonják ki a n-láncúakat.

Törzsek: *Candida tropicalis*, *C. lipolytica*, *C. guilliermondii*

Technológia: az n-alkán rosszul oldódik: emulzió, 0.01-0.50 µm cseppek, felületaktív anyag kell hozzá + a mikroba is termeli, jól hasznosul. Négyfázisú rendszer: víz, olaj, sejtek, levegő – diszpergálni kell.

Az élesztőkben a passzív diffúziót elősegíti a sok lipid a citoplazma-membránban.

Nagy az O₂ igény (2-3 vvm) és a hőfejlődés: 1kg SCP-hez 1-1,2 kg alkán, 2,2 kg O₂ és 27000 kJ hőfejlődés tartozik.

Airlift, magas reaktor, túlnyomásos, nagy térfogatok.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

24

TENYÉSZTÉS SZÉNHYDROGÉNEKEN

Paraméterek:

- n-alkánál: $\mu_{\max} = 0,28$ $Y = 0,98$
- glükóznál: $\mu_{\max} = 0,62$ $Y = 0,51$

→

Kapacitások:

BP technológia: Szardínia, Japán

Kapacitás 200.000 t/év; de 1973-ban bezárták, társadalmi nyomás hatására, noha engedélyezett termék volt.

SZU/Oroszország: tömegtermelés (több százezer t/év),


Candida guilliermondii törzssel

Romániában volt egy üzem, ~60.000 t/év, ma?



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

25



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

26

TENYÉSZTÉS METÁNON

Eltérés: a metán gáz halmazállapotú, oldhatósága kicsi. Nem keverhető a levegővel, mert robbanásveszélyes. A metánnak a folyadékon áthaladva teljesen el kell fogynia. Kevert reaktorban ez nem megy → csőreaktor → még jobb: cirkulációs reaktor: U-loop fermentor

UniProtein eljárás:


Methylococcus capsulatus, folyamatos: $D=0,20-0,25 \text{ h}^{-1}$
biomassza: 20-30 g szá/liter

Feldolgozás: centrifugálással 22%-ra koncentrálják,
70 °C-ra melegítik (RNS csökkentés),
porlasztva szárítják



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

27



TENYÉSZTÉS ALKOHOLOKON

a.): etilalkoholon

Csak akkor volt versenyképes, amikor a földgázból nyert EtOH nagyon olcsó volt (etán → etilén → etanol → SCP).

Kapacitások:

USA: 7.000 t/év, *Candida utilis* törzs, Hozam: $Y = 0,7$
élelmiszer kiegészítőként alkalmazták

Csehország: volt egy nagy üzem, ahol takarmány-élesztőt gyártottak.

A rendszerváltás óta nincs információ.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

29

TENYÉSZTÉS METANOLON

A metanolt a földgáz metánjából parciális oxidációval nagy tömegben, olcsón lehetett előállítani. Erre épült egy komoly SCP ipar.

Nagyon sokféle baktérium képes a metanolt hasznosítani.

Obligát metilotróf baktériumok: *Methylobacter*, *Methylococcus*, *Methylomonas*, *Methylosinus*, *Methylocystis*

Fakultatív metilotróf baktériumok: *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Klebsiella*, *Micrococcus*, *Protaminobacter*, *Pseudomonas*, *Streptomyces*, *Rhodopseudomonas*, *Vibrio*


Fakultatív metilotróf élesztők: *Candida boidinii*, *Hansenula capsulata*, *Pichia haplophila*, *P. pastoris*, *Torulopsis glabrata*

Fakultatív metilotróf gombák: *Paecilomyces*, *Trichoderma*



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

30



METANOL ASSZIMILÁCIÓ

1. ribulóz-monofoszfát út:
 Kulcsenzime a hexulóz-foszfát szintáz
 Ezen az úton a hozam eléri az $Y = 0,5$ -et →

32


BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

METANOL ASSZIMILÁCIÓ

2. szerin út:
 Kulcsenzime a szerin-transzshidroximetiláz, amely egy glicinhez kapcsolja az aktív formaldehidet, és ezáltal szerint termel.
 Ezen az úton a hozam csak $Y \sim 0,3$
 A szerin úton hasznosító baktériumok szilárd tápoldaton általában rózsaszín pigmentet termelnek.
 →

33

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék



ICI TECHNOLOGIA

Törzs: *Methylophilus methylotrophus*
 Hexulóz-foszfát út, $Y = 0,53$, és gyors növekedés.
 Génmanipuláció: a sok fehérjéhez sok Glu-ra van szükség.
 A *M.m.* ezt transzaminálással szintetizálja, ahol az aminoszintetizáló Gln:

$$\alpha\text{-keto-glutársav} + \text{Gln} = 2 \text{ Glu}$$

Ugyanezt az *E. coli* egyszerűbben végzi, ammónium ionnal.

$$\alpha\text{-keto-glutársav} + \text{NH}_4^+ = \text{Glu}$$

Ezt az enzimet klónozták át a *M.m.*-ba, javítva a fehérje termelést.

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék
35

ICI TECHNOL

Reaktor: óriási toronyfermentor, 60 r
 $V = 3000 \text{ m}^3$, benne lyukacsos tálcás tására.

MŰSZAKI CSÚCSTELJESÍTMÉNY!
 A metanolt 8000 (!!) ponton táplálták a koncentrációja. Emiatt a hozam
 Folytonos, $D = 0,2$, $t = 37 \text{ }^\circ\text{C}$, $\text{pH} = 7$
 ~100 napig üzemelt fertőződés nélkül
 A sejtek szeparálása után a levét (ré
 Produktivitása: 4 g/l/h
 Kilépő koncentráció: 30 g/l
 Kapacitás: 70.000 t/év

BME Alkalmazott Biotechnológia

ICI REAKTOR



ICI TECHNOLOGIA

Feldolgozás:

- a lefejtett levet savas közegben 70°C-on kezelik, így az RNS koncentráció csökken,
- steril centrifugálás,
- a levet (részben) visszatáplálják,
- a sejteket szárítják.

A beruházás ~150 millió GBP-ba került.

Az egész világ a csodájára járt, de mire elkészült (1980) már gazdaságtalan volt.

A termék költsége ~600 USD/t fehérje, míg a halliszt és a szója 2-300 dollár/t-ba került.

Áttértek a Mycoprotein-re (*Fusariummal*) – de ebből nem kellett annyi, csak néhány ezer tonna.



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

38

ICI REAKTOR BONTÁSA



1988



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

39

ENGEDÉLYEZTETÉS

Amikor az ICI elkezdte a projektet, még nem volt sem szervezet, sem szabály az engedélyezésre, ezeket menet közben kellett kialakítani. Azóta a WHO és a IUPAC foglalkozik vele, megvannak az eljárások. Vizsgálni kell:

TAKARMÁNYRA:

- » Toxikológia
- » Teratogénia
- » Mutagenitás
- » Szermaradványok
- » Emészthetőség szempontjából.

ÉLELMISZEREKRE még pluszban

- » klinikai vizsgálatokat írnak elő



BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

40
