

# BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA


## 2. rész

Előadó: Ballagi András, Ipari Professzor  
Richter Gedeon NyRt. - BME

Írásos segédanyag található a:

<http://oktatas.ch.bme.hu>  
/oktatas /konyvek /mezgaz  
/Biol-biotech-vegyszer-MSc címen

Itt tartunk:





# Why study Microbiology

Microbes are related to all life.

- In all environments
- Many beneficial aspects
- Related to life processes (food web, nutrient cycling)
- Only a minority are pathogenic.
- Most of our problems are caused by microbes

**Relative sizes of cells and their components**





# Bacteria

Prokaryotes

Peptidoglycan cell walls


Binary fission

For energy, use

organic chemicals,

inorganic chemicals,

photosynthesis



**(a)**

# Archaea

Prokaryotic

Lack peptidoglycan


Live in extreme environments

Include:

- Methanogens

- Extreme halophiles

- Extreme thermophiles



# Fungi


Eukaryotes

Chitin cell walls

Use organic chemicals for energy

Molds and mushrooms are multicellular consisting of masses of mycelia, which are composed of filaments called hyphae

Yeasts are unicellular



**(b)**


# Protozoa

Eukaryotes

Absorb or ingest organic  
chemicals

May be motile via pseudopods,  
cilia, or flagella

Some of them parasites



**(e)**



# Algae


Eukaryotes

Cellulose cell walls

Use photosynthesis for energy  
(primary producers)

Produce molecular oxygen and  
organic compounds

Metabolically diverse



**(d)**

# Viruses


Acellular

Consist of DNA *or* RNA core

Core is surrounded by a protein coat

Coat may be enclosed in a lipid envelope

Viruses are replicated only when they are in a living host cell



**(e)**


# Multicellular Animal Parasites

Eukaryote

Multicellular animals

Parasitic flatworms and  
round worms are called  
helminths.

Microscopic stages in life  
cycles.



# Nomenclature

**Carolus Linnaeus (1735)**

**Binomial (scientific) nomenclature**

**Gives each microbe 2 names**

**Genus - noun, always capitalized**

**species - adjective, lowercase**

**Both italicized or underlined**

***Staphylococcus aureus* (S. aureus)**

***Bacillus subtilis* (B. subtilis)**

***Escherichia coli* (E. coli)**

**When two organisms share a common genus are related.**

# Mikroökológia

**Élőhelyek: levegő, víz, talaj**


**Életformák: szaprofita, szimbionita, kommenzalista, parazita**

**Életkörülmények: hőmérséklet tolerancia**

**(pszichrofil, mezofil, termofil)**

**pH tolerancia (acidophil, neutrophil, alkalophil)**

**Sótűrés (ozmotolerancia)**



**Mikrobák szerepe a bioszférában: fotoszintetizálók (CO<sub>2</sub>-t megköthetnek),**

**Energiát termelhetnek**

**lebontók: C, N, P, S körforgalomba visszajuttatása**

## Keletkezhet spontán módon élet?

The hypothesis that living organisms arise from nonliving matter is called spontaneous generation. According to spontaneous generation, a “vital force’ forms life.

The alternative hypothesis, that the living organisms arise from preexisting life, is called biogenesis.

## Keletkezhet spontán módon élet?



The belief in the spontaneous generation of life from nonliving matter was introduced by **Aristotle**, who lived around 350 BC.

According to Aristotle, it was:

*“readily observable that aphids arise from the dew which falls on plants, fleas from putrid matter, mice from dirty hay.”*

This belief remained unchallenged for more than 2000 years.

Until...



Aristotle: 384 - 322 B.C.

# Keletkezhet spontán módon élet?

## Experiments on Flies

**First to formally challenge the accepted belief of spontaneous generation.**


**Redi's Question: Where do maggots come from?**

**Hypothesis: Maggots come from flies.**

**Experiment: Redi put meat into three separate jars.**


### Jar-1

- Left open
- Maggots developed
- Flies were observed laying eggs on the meat in the open jar




### Jar-2

- Covered with netting
- Maggots appeared on the netting
- Flies were observed laying eggs on the netting



### Jar-3

- Sealed
- No maggots developed



**Francesco Redi,  
Italian physician,  
naturalist & poet,**

**1626 – 1697.**



## Keletkezhet spontán módon élet?


**What causes tiny living things to appear in decaying broth?**

*Needham's Hypothesis:* Spontaneous generation.

*Spallazani's Hypothesis:* Microbes come from the air.


Boiling will kill them.

Needham >



1713 - 1781

Spallazani >




1729 - 1799

Keletkezhet spontán módon élet?


Louis Pasteur és az Ipari Microbiológia

**Pasteur's observations:**

Are these non-living blobs or living microbes?




1822 - 1895



< yeast + grapes = yummy wine 😊 (ethanol)

bacteria + grapes = spoiled wine ☹️ (lactic acid) >



# Fermentation and Pasteurization

**Pasteur showed that microbes are responsible for fermentation.**

**Fermentation is the conversion of sugar to alcohol to make beer and wine.**

**Microbial growth is also responsible for spoilage of food.**


**Bacteria that use alcohol and produce acetic acid spoil wine by turning it to vinegar (acetic acid).**

**Pasteur demonstrated that these spoilage bacteria could be killed by heat that was not hot enough to evaporate the alcohol in wine. This application of a high heat for a short time is called pasteurization.**

# Elméletek a betegségek mikrobiális eredetéről

## Oliver Wendell Holmes (US)


Believed death following childbirth (puerperal fever) often caused by the material on hands of midwives or attending physicians.



1809 - 1894

## Semmelweis Ignác (Ausztria – Magyarország)

Noticed death rates higher in maternity wards staffed by medical students than in those attended by midwives. Death rates decreased in summer.



1818 - 1865

# Elméletek a betegségek mikrobiális eredetéről

**Robert Koch**

**Experimented with medium to grow bacteria on.**


**He tried gelatin, but it did not work.**

**Wife of colleague recommended agar (a gelatin-like product derived from seaweed).**


**Didn't melt, and bacteria couldn't digest it.**

**He could also add various nutrients necessary to grow certain organisms.**

**Koch originated use of a two part dish for growing bacteria „Petri dish” named after Julius Petri, a German bacteriologist), and a technique for isolating pure bacterial colonies.**




**1843 - 1910**




# Elméletek a betegségek mikrobiális eredetéről

## Koch's Postulates



1843 - 1910



## Az immunológia kezdetei – Edward Jenner

**Was aware of farm workers' belief that if you had cowpox in past, you wouldn't get smallpox.**

**Cowpox caused mild discomfort, aching, a few pustules, some swelling...symptoms that disappeared in a few days.**

**In contrast, smallpox caused massive disfigurement, sometimes blindness, and often death.**

**Jenner, in the late 1700s, made small incisions or punctures with cowpox material in arms of human subjects in order to prevent smallpox.**

**Jenner's works are said to have saved more lives than the efforts of any other person in history.**



1749 - 1823



# Az immunológia kezdetei – Luise Pasture

Individuals who recover from an infectious disease sometimes immune from future attack.


Prompted Pasteur to try to find a way to prevent fowl cholera in chickens.

Colleague of Pasteur's postponed inoculations of cholera into a group of chickens, a remarkable discovery resulted.

Inoculation with these neglected cultures made the chickens immune to fowl cholera.

The microbes had been weakened or attenuated.

Pasteur also modified other organisms (anthrax and the virus causing rabies). Ultimately created inoculation procedures of vaccinations.



1822 - 1895





## A modern kemoterápia megjelenése

- Treatment with chemicals is chemotherapy.
- Chemotherapeutic agents used to treat infectious disease can be synthetic drugs or antibiotics.
- Antibiotics are chemicals produced by bacteria and fungi that inhibit or kill other microbes.
- Quinine from tree bark was long used to treat malaria.
- 1910: Paul Ehrlich developed a synthetic arsenic drug, salvarsan, to treat syphilis.
- 1930s: Sulfonamides were synthesized.


# Az antimikrobiális szerek felfedezése

**Alexander Fleming (1881 – 1955), a Scottish biologist and pharmacologist, observed bacterial staphylococci colonies disappearing on plates contaminated with mold.**

**Fleming extracted the compound from the mold responsible for destruction of the bacterial colonies.**

**The product of the mold was named penicillin, after the *Penicillium* mold from which it was derived.**


**Nobel Prize in Physiology of Medicine in 1945.**



## A penicillin gátló hatása

**Fleming 1928-ban egy Staphylococcus törzs tenyésztésével foglalkozott a londoni St. Marry's kórház fertőző betegségek osztályán. Háromhetes szabadságáról visszatérve azt tapasztalta, hogy az asztalán felejtett tenyészet penésszel fertőződött meg. (Valami ehhez hasonló látvány fogadta.) A fertőzés körül a baktériumok nem növekedtek.**



**Ez vezetett ahhoz a felfedezéshez, hogy bizonyos gombafajok a baktériumok szaporodását gátló anyagokat termelnek.**



# A penicillin gátló hatása



Az antibiotikumok hatásosságát mai napig úgy határozzák meg, hogy lemérik annak a gyűrűnek az átmérőjét, amelyben gátolta a baktérium növekedését.

Később – feltételezve, hogy találhatnak más gombákat, amik még több penicillin kibocsátására képesek szűrővizsgálatokat alkalmazva választották ki azt a *Penicillium chrysogenum* (NRRL1951) törzset, amelyet egy rothadt sárgadinnyéről izoláltak, és ez a törzs lett a szülő-egyede mindazon ipari mutáns törzseknek, amelyekkel jelenleg a világ igen sok országában a penicillint előállítják.



**Fleming tudatában volt felfedezésének világméretű jelentőségére, ezért eljárását és a penicillint nem engedte szabadalmaztatni, hanem a gyógyítás érdekében az 1950–es évektől kezdve a világ minden országának rendelkezésére bocsátotta.**

**Magyarországon maga Fleming adta át a penicillin termelő törzsét az Országos Közegészségügyi Intézetnek.**



## Modern Developments in Microbiology

Bacteriology is the study of bacteria.

Mycology is the study of fungi.


Parasitology is the study of protozoa and parasitic worms.

Recent advances in genomics, the study of an organism's genes, have provided new tools for classifying microorganisms.


Transcriptomics is looking at the m-RNA as gene products

Proteomics is looking at the protein as gene products

Itt járunk:



# Mikrobiológiai módszerek



## Izolálás

**A technológia alapját képező mikroorganizmus megtalálása.**

**Beszerezési források: a mikroorganizmusok természetben lévő biotópjából – talaj, iszap, víz, levegő, élő szervezetek**

**Isolate strains from extreme or unusual environments**

**Hope such strains may be capable of producing new metabolites.**

**For instance, microorganisms from high altitudes, cold habitats, sea water, deep sea, deserts, geysers, and petroleum fields are being examined**





# Mikrobiológiai módszerek



## Kényelmes beszerzési források: a törzsgyűjtemények

**American Type Culture Collection (ATCC). Rockville, Maryland, U.S.A.,**

**NRRL: US Department of Agriculture, Northern Regional Research Center**

**NCIMB: National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd.**

**FERM: Fermentation Research Institute, Tokyo, Japan,**

**CMI: Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England,**

**ECACC: European Collection of Cell Cultures**

**C.I.P.: Colletion de Bactéries de l'Institut Pasteur**

**OKI: Orvosi Baktériumok Magyar Nemzeti Gyűjteménye**


**Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem: Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye**

# Mikrobiológiai módszerek

## Izolálás

**Szilárd minta** → ez a leggyakoribb, mert itt legnagyobb a diverzitás  
**minta** → közvetlenül Petri csészére  
**minta** → vizes szuszpenzió → Petri csészére  
**minta felszínéről steril vattával**



## Inkubálás



**Folyadék minta** → esetleges hígítás → esetleges dúsítás előinkubációval



→ szűrés+agar+inkubálás



**Levegő minta** → szűrés+agar+inkubálás


# Mikrobiológiai módszerek

**Agar is a complex polysaccharide isolated from red algae  
solid at room temp, liquefies at boiling (100°C),  
does not resolidify until it cools to 42°C  
provides framework to hold moisture & nutrients  
not digestible for most microbes**




# Mikrobiológiai módszerek

## Mikroorganizmusok egy természetes mintából





# Mikrobiológiai módszerek

Egyetlen sejtől származó kolónia előállítása



# Mikrobiológiai módszerek

## Izolálás és screenelés kézi módszerrel




# Mikrobiológiai módszerek

## ENRICHMENT MEDIA

Enriched media are media that have been supplemented with highly nutritious materials such as blood, serum or yeast extract for the purpose of cultivating fastidious organisms.

Eg., Blood agar, Chocolate agar



# Mikrobiológiai módszerek

## Szelektív média:

- pl.: antibiotikum → csak gombák nőnek
- antifungális szerek → baktériumok nőnek
- savanyú közeg → élesztők nőnek
- speciális tápanyag → pl. metanol hasznosítók nőnek
- aminósavak hiánya → heterotrófok nőnek

Inkubálás



**Eosin-methyleneblue agar (EMB)**  
Contains methyleneblue,  
toxic for Gram+ bacteria,  
allowing only the growth of Gram– bacteria




# Mikrobiológiai módszerek

## Differential media:

...are widely used for differentiating closely related organisms or groups of organisms. Because of the presence of certain dyes or chemicals in the media, the organisms will produce certain characteristic changes or growth patterns that are used for identification or differentiation of microorganism.

Eg., Mac Conkey (MCK) agar, Eosin Methylene Blue (EMB) agar

*Enterobacter cloacae*  
Lactose fermenter



The gram-positive bacteria  
*Staphylococcus aureus*

*Pseudomonas aeruginosa*  
lactose nonfermenter (pink colonies)

*Escherichia coli* typical lactose fermenter (colonies with green metallic sheen)

# Mikrobiológiai módszerek

## Screening

Keresni azokat a törzseket az izolátumok között, amelyek:



**Nagy termelőképességgel rendelkeznek**

**Stabil biokémiai és genetikai tulajdonsággal rendelkeznek (80-100 gen.)**

**Nem termelnek káros melléktermékeket**

**Könnyen tenyészthetők nagy léptékben is (mert pl. elég gyorsan nőnek)**

**Egy példa: Tejsavtermelő baktérium törzs kiválasztása**



Tápoldat  
+ pH függő  
festék  
+ agar



Tápoldat  
+ CaCO<sub>3</sub>  
+ agar





# Mikrobiológiai módszerek

## High Throughput Screening (HTS)

Nagy számban, automatizált módon keresni termelő törzseket az izolátumok között:


Lépései:

1. Egy sejtől indult kolónia azonosítása képelemzéssel
2. A kolónia érintése steril eszközzel (pipettahegy, pálca, kacs),  
v. mikrocshipsz alkalmazása mikroszkóp alatt.
3. A kolónia átvitele friss folyékony tápoldatba
4. Tenyésztés (inkubáció)
5. In-line v. at-line analízis sejtszámra, termékre, vagy intermedierre
6. A legjobb termelők elkülönítése további vizsgálatra




# Mikrobiológiai módszerek

## High Throughput Screening (HTS) work station



# Mikrobiológiai módszerek

## High Throughput Screening (HTS) multi work station



# Mikrobiológiai módszerek

## Identifikáció

### Fenotípusosan:

**makroszkópikus tul.:** telep színe, nagysága, formája

**mikroszkópikus tul.:** sejt alakja, csoportosulása, mozgásszerve,  
sejtmagja, sejtfala (Gram festés, más festések)


**biokémiai tul.:** oxidáz próba, aerob/anaerob dextróz fogyasztás,  
ureáz, kénhidrogén, Analytical Profile Index (API), stb.



# Mikrobiológiai módszerek

Identifikáció:

Analytical Profile Index (API)



**ONPG ( $\beta$ -galactosidase),  
ADH (arginine dihydrolase),  
LDC (lysine decarboxylase),  
ODC (ornithine decarboxylase),  
CIT (citrate utilization),  
H<sub>2</sub>S (sulfide production),  
URE (urease),  
TDA (tryptophane deaminase),  
IND (indole production),  
VP (Voges-Proskauer reaction),**

**GEL (gelatin liquefaction),  
GLU (glucose fermentation),  
MAN (mannitol fermentation),  
INO (inositol fermentation),  
SOR (sorbitol fermentation),  
RHA (rhamnose fermentation),  
SAC (sucrose fermentation),  
MEL (melibiose fermentation),  
AMY (amygdalin fermentation),  
ARA (arabinose fermentation)**

# Mikrobiológiai módszerek

Identifikáció: Analytical Profile Index (API)

cultu re no.	O	A	L	O	C	H	U	T	I	V	G	G	M	I	S	R	S	M	A	A
	N P G	D D H	D D C	D D C	I T T	2 S	R E	D A	N D	P	E L	L U	A N	N O	O R	H A	A C	E L	M Y	A R A
8030	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8068	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-
8P14	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+

**8030** *Klebsiella pneumoniae*







**8068** *Proteus vulgaris*

**8P14** *Salmonella sp.*



# Mikrobiológiai módszerek

Genetikai identifikáció:  
pl. 16S RNS szekvencia alapján



# Mikrobiológiai módszerek

## Tartósítás fenntartás

**-aktív formában:**

**-szárítva ampullában (liofilezve)**

**-lelassítva agaron, hűtőben  
(időszakos átoltás)**


**-ferdeagar kémcsőben (+olaj)**

**-szűrt agar kémcsőben (anaerobok)**

**-petricsészés agaron**

**- fagyasztva (-150°C, folyékony nitrogén -193°C)**


**-inaktív formában: spórák, szaporítóképletek**



## Időszakos átoltás



# Liofilezés



## Tartósítás mélyhűtéses fagyasztással



# Mikrobiológiai módszerek

## Törzsfejlesztés mutációval


**Az élőszervezet képességeit a genomja határozza meg → a fejlesztéshez genomot kell módosítani → mutáció**

### Fizikai mutagének:

**-besugárzás - UV, gamma, Röntgen; dózis (intenzitás x idő)**

### Kémiai mutagének:

**-DNS-t megváltoztató anyagok, dózis (koncentráció x idő)**



# Mikrobiológiai módszerek


Törzsfejlesztés gén manipulációval

Az élőszervezet képességeit a genomja határozza meg → a fejlesztéshez genomot kell módosítani → molekuláris biológiai beavatkozás DNS szinten


Új gén bevitele: plazmidba v. kromoszómába

Meglévő gén átalakítása: deléció, inzerció, site directed mutagenesis, szintetikus gén bevitel

Promóterek befolyásolása: aktiválása (m-RNS szintézis növelése)  
elnyomása (m-RNS szintézis csökkentése)



# Mikrobiológiai módszerek: Összefoglalás





# Általános felszerelések egy mikrobiológiai laboratóriumban

- Sterilfülke
- Tápoldatok
- Tenyésztőedények
- Hűtők
- Folyékony nitrogén
- Centrifugák
- Termosztát
- Kacs, szélesztő bot
- Pipetta
- Autokláv
- Hőlégsterilező
- Fagyasztókapszula
- Mikroszkóp
- ELISA-reader




**CO<sub>2</sub> termosztát emlős sejt tenyésztéshez**  
**37°C**  
**5% CO<sub>2</sub>**  
**100% páratartalom**

## Steril munkavégzés

**HEPA (high efficiency particulate air )filter  
99.99%-ban kiszűri a  
levegőből a 0.2 mikron  
méretű részecskéket.**

**A szűrt levegőt a rendszer  
folyamatosan áramoltatja  
a munkafelületen.**




# Tenyésztőedények baktériumokhoz, élesztőkhöz, gombákhoz


## Petri-csészék




## Flaskák




## Tenyészőedények emlős sejtekhez



T- flasks




Side view




View from bottom

Roller bottle





Spinner bottle

# Tenyésztőedények emlős sejtekhez



- **Petri-csészék**
- **Többlyukú lemezek (plate)**
- **Flaskák**



# Mikroszkóp

**A sejtek növekedésének vizsgálata**

**A sejszerkezet vizsgálata**

**A sejt életképesség vizsgálata**

**Fertőzések kiszűrése**

**Sejtszámolás**

**Festési eljárások**

**Transzfekeció ellenőrzése**




# Mikroszkóp


Anton van Leeuwenhoek (1632-1723)

Elsőként észlelt szabad szemmel nem látható képleteket és élőlényeket  
kb.1674


Az általa elért nagyítás 300X



(1632-1723)




# Fénymikroszkóp







# A fény útja




# A hullámhossz hatása a felbontásra




# Olaj immerziós lencse




# Effect of magnification




# Types of light microscopes



(a)



(b)






(c)

**Bright-field – most widely used, specimen is darker than surrounding field**

**Dark-field – brightly illuminated specimens surrounded by dark field**

**Phase-contrast – transforms subtle changes in light waves passing through the specimen into differences in light intensity, best for observing intracellular structures**


# Sötéltátóterű mikroszkóp



**A sötét látóterű mikroszkóp működésének alapja:**

**a kondenzor speciális rekesze (diafragmája) azokat a sugarakat szűri ki, amelyek az objektívbe jutnának, így csak a tárgy pontjain szóródó fénysugarak vesznek részt a kép kialakításában**


# A fáziskontraszt mikroszkóp működési elve




Egyes, a fényforrásból a kondenzoron át érkező sugarak a mintán fáziskésést szenvednek, amit az objektív gyűrűdiafragmája megnövel (A); a késést nem szenvedő és az adott hullámhosszal késő sugarakat az objektív fókuszálja: itt a fellépő interferencia következtében a találkozó hullámok vagy kioltják, vagy erősítik egymást (kontraszt alakul ki) (B); A gyűrűdiafragmák felülnézeti képe rajzon és a valóságban (C)

# Fáziskontraszt mikroszkóp

## Phase Contrast Microscope Configuration



## Phase Contrast Optical System Alignment








# Fluorescence Microscope


**Modified compound microscope with an ultraviolet radiation source and a filter that protects the viewer's eye**

**Uses dyes that emit visible light when bombarded with shorter uv rays.**

**Useful in diagnosing infections**




# Fluorescence Microscope



# Fluoreszcens festékek

- **Hoechst 33342:kék**
  - szelektív nukleáris festék
  - kromatin kondenzáció, fragmentáció
- **Bis-L-aszpartát amid (caspase 3 szubsztrát): zöld**
- **TMRE: mitokondrium polarizáció : piros**





# Konfokális mikroszkóp

A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. A hagyományos mikroszkópokkal szemben, ahol a minta egy területét éri a megvilágítás, a konfokális mikroszkópnál egyszerre csak a minta egy pontját világítják meg, így a konfokális elrendezés önmagában nem ad képet. A pásztázó nyaláb végig megy a vizsgálandó felületen (beam scanning), épp úgy, ahogy az elektronsugár a tévéképernyőn.


A detektor minden egyes pontban megméri a fény intenzitását. A kapott digitális kép számítógéppel kezelhető és elemezhető. Több szelet képét összerakva a fluorofór térbeli elhelyezkedése is vizsgálható.

A konfokális képalkotás lényege, hogy a rendszer csak a fókuszsíkból jövő fényt detektálja.




# Konfokális mikroszkóp


## Fundamental Set-up of Fluorescence Microscopes: **confocal vs. widefield**



Confocal  
Fluorescence  
Microscopy



Widefield  
Fluorescence  
Microscopy



## Electron microscopy

Forms an image with a beam of electrons that can be made to travel in wavelike patterns when accelerated to high speeds.

Electron waves are 100,000X shorter than the waves of visible light.

Electrons have tremendous power to resolve minute structures because resolving power is a function of wavelength.



Magnification between 5,000X and 1,000,000X

# Electron microscopy


## Two types

Transmission electron microscopes (TEM)


Scanning electron microscopes (SEM)




**Scanning EM image of HIV budding from the cell surface of a lymphocyte (arrow).  
Bar, 100 nm. Magnification,  $\times 50,000$ .**



# Transmission Electron Micrograph



(a)




(b)

**TEM involves a high voltage electron beam emitted by a cathode. The electron beam that has been partially transmitted through the very thin (and so semitransparent for electrons) specimen carries information about the structure of the specimen. The "image" is then magnified by a series of magnetic lenses until it is recorded by hitting a fluorescent screen, photographic plate, or light sensitive sensor such as a CCD (charge-coupled device) camera. Darker areas represent thicker, denser parts and lighter areas indicate more transparent, less dense parts**



## Scanning Electron Micrograph



**SEM – provides detailed three-dimensional view. SEM bombards surface of a whole, metal-coated specimen with electrons while scanning back and forth over it. Unlike the TEM, where the electrons in the primary beam are transmitted through the sample, the Scanning Electron Microscope (SEM) produces images by detecting secondary electrons which are emitted from the surface due to excitation by the primary electron beam.**

**In the SEM, the electron beam is scanned across the surface of the sample in a raster pattern, with detectors building up an image by mapping the detected signals with beam position.**

# Sejtszámolás és életképesség vizsgálat

## Mikroba mérés:

1. OD-optical density (UV-Vis photometer, 600-660nm)
2. Turbidimetria (online)
3. Mikroszkóp – sejtszámlálás Bürker kamrával ( $10^6$  db/ml)
4. Cellcounter ( $10^6$  db/ml)
5. Sejt Szárazanyag (1-10 g/L)
6. Hígításos szélesztéses módszer (CFU/ml)

# Sejtszámolás és életképesség vizsgálat

A sejtekkel végzett munka napi rutin része a sejtek számlálása és életképességüknek vizsgálata. Tripánkék festékekkel, Bürker vagy Neubauer kamra segítségével szokták végezni.

